

130.00 mm

“晟德” 適喘寧液 0.5毫克/毫升
"Center" Strolin Liquid 0.5mg/ml

GMP
衛署藥製字第 043189 號
G-6810

主成份：每毫升(ml)含有
Fenoterol Hydrobromide.....0.5 mg

適應症：
下列支氣管痙攣疾患之預防與治療：
支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、肺氣腫和伴有支氣管痙攣之肺支氣管障礙。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
成人(14歲以上)：每次5~10毫升，每日三次
6-14歲：每次5毫升，每日三次
1-6歲：每次2.5~5毫升，每日三次
1歲以下幼兒：每次2.5毫升，每日二次
本品用於產科相關適應症時，須經醫師審慎評估病患使用本品之效益大於風險時方可使用，應嚴密監視母親及胎兒發生心血管相關不良反應之風險，尤其是於長時間的使用下(超過48小時)。

藥理作用：
Fenoterol HBr用來治療及預防支氣管氣喘和支氣管炎的支氣管痙攣，可解除各種型式之支氣管痙攣，並對引起支氣管收縮的刺激皆有預防的作用。
Fenoterol HBr對支氣管肌肉具快速的起始作用與很長的作用時間，而且Fenoterol HBr對支氣管具有選擇性，所以全身性的副作用不易發生，故可長期使用，以減輕發作的敏感性和呼吸困難的症狀。

交互作用：
1. 鹵素麻醉劑：因有降壓之作用，可能會增強子宮收縮無力及出血之風險，因此本藥品至少停用6小時後才能使用鹵素麻醉劑。
2. 皮質類固醇：皮質類固醇可能造成血糖增加或血鉀離子降低，應小心使用並監測高血糖或低血鉀之風險。
3. 糖尿病用藥：本藥品可能會增加血糖，因此糖尿病患者需要時應調整糖尿病用藥之劑量。
4. 鉀離子排除劑：本藥品可能有降低血中鉀離子濃度，因此使用其他可能降血鉀的藥品(如利尿劑、毛地黃、xanthine類藥品或皮質類固醇...等)，避免因低血鉀增加心律不整之風險。

禁忌：
- 有缺血性心臟病史或帶有缺血性心臟疾病危險因子。
- 孕期小於22週者。
- 當繼續懷孕或安胎被認為是危險的情況(例如：嚴重妊娠毒血症、子宮內感染、前置胎盤造成之陰道出血、子癲癇或重度子癲癇之前兆、胎盤早期剝離、臍帶壓迫等)。
- 死胎及已知致死性胎兒畸形或染色體異常。
- 嚴重之肺動脈高壓(可能出現肺水腫)或心臟疾病(例如：主動脈瓣狹窄或心肌功能異常等情形)。
- 嚴重甲狀腺亢進。
- 控制不良之糖尿病(可能出現酮酸中毒)。
- 曾對本品或賦形劑過敏者。

180.00 mm

副作用：

- 1.本藥耐受性好，但偶有手指震顫不安或心悸發生。
 - 2.偶有眩暈疲勞、出汗、口乾等副作用，此時應減低劑量。
- 大部分不良反應的發生主要與本品的藥理活性有關，大多停藥或調整劑量則可避免或回復。
- 心血管方面：非常常見：心悸過速
常見：心悸、舒張壓下降、低血壓
少見：心律不整(如心房顫動)、心肌缺血、周邊血管擴張
 - 代謝方面：常見：低血鉀
少見：高血糖
 - 胸腔方面：肺水腫

注意事項：

- 1.對主成分過敏者禁用。
- 2.甲狀腺機能亢進、瓣膜下主動脈狹窄、心跳過速之病患禁用。
- 3.本品對子宮收縮具有抑制作用，故孕婦須謹慎用藥。
- 4.糖尿病患者須小心使用。
- 5.在醫生監督下才可與其他擬交感神經性支氣管擴張劑或抗副交感神經性支氣管擴張劑同時使用。
- 6.有血管障礙或心肌梗塞的病人應由醫師監督下方可使用。
- 7.對於罹患支氣管氣喘的病人其劑量必須小心的調整。
- 8.本藥品用於產科相關適應症(如預防早、流產)時，須經醫師審慎評估病患使用本藥品之效益大於風險時方可使用，且應嚴密監視母親及胎兒發生心血管相關不良反應之風險，尤其是於長時間的使用下(超過48小時)。
- 9.使用本品有發生肺水腫及心肌缺血之通報案例，應注意體液平衡及心肺功能，誘發因子包括多胎妊娠、體液超過負荷、產婦感染或子癲癇症之前兆。
- 10.使用本品可能會伴隨心跳加快及血壓降低。

賦形劑：Benzoic Acid, Methylparaben, D-Sorbitol Solution (70%), Peach Essence, Water Purified

包裝：5~4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-028 20150105

14S12-D02