

# “強生”思碧來膠囊（斯比樂） SULPIRIDE CAPSULES "JOHNSON"

衛署藥製字第021199號

【成分名(中文名)】 Sulpiride (斯而比來特)

【賦形劑】 Dried Starch、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate  
膠囊殼：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide

【劑型、含量】 膠囊劑：每膠囊含Sulpiride 50mg

【臨床藥理】 1.本品具有強力的抗Dopamine作用，強力抑制Apomorphine或Meta-Amphetamine等之Dopamine樣刺激作用。

2.本品亦具有潰瘍癒合作用，能抑制下視丘後部以電氣刺激造成的胃粘膜血流的停滯而產生部分之貧血現象。

【適應症】 精神病狀態、消化性潰瘍。

【用法・用量】 本藥須由醫師處方使用。

①精神分裂病：通常成人一日300-600mg，分次口服。但可以依年齡、症狀做適宜的增減。  
②每日最高劑量為1200mg。

③憂鬱病、憂鬱狀態：通常成人一日150-300mg，分次口服。但可以依年齡、症狀做適宜的增減。  
④每日最高劑量為600mg。

⑤胃、十二指腸潰瘍：通常成人一日150mg，分3次口服，並依病情酌量增減。

## 【注意事項】

### 一、胃、十二指腸潰瘍時：

- 一般注意事項：給與本劑可能會出現間腦之內分泌機能調節異常，錐體外徑症狀等的副作用，所以，給與本劑時，須充分考慮其有效性與安全後使用。
- 下列患者請勿給藥：疑似有嗜鉻細胞瘤之患者（有引起血壓急劇上升之虞）。
- 下列患者應慎重給藥：(1)小兒（易出現錐體外徑症狀，故須注意給藥，不可過量）。  
(2)老年人。
- 對孕婦的給藥：有關懷孕中給藥的安全尚未確立，所以，在孕婦或可能已懷孕的婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時，才可給藥。
- 對授乳婦的給藥：對新生兒之安全性尚未確立，所以，在授乳期間的婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時，才可給藥。
- 其他：(1)對於正在給與本劑之患者，須注意勿使其從事開車等伴有危險性的機械操作。  
(2)因有止吐作用，所以可能會使腸阻塞，腦瘤等引起的嘔吐症狀變得不明顯，故須嚴密觀察，慎重給藥。

### 二、精神分裂病時：

- 下列患者請勿給藥：疑似有嗜鉻細胞瘤之患者（有引起血壓急劇上升之虞）。
- 下列患者應慎重給藥：(1)有或疑似有心、血管疾病、低血壓之患者。(2)有腎病變之患者。(3)高齡者。
- 對孕婦的給藥：有關本劑之懷孕中給藥的安全性尚未確立，所以，在孕婦或可能已懷孕婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時，才可給藥。
- 對授乳婦的給藥：本劑對於新生兒之安全性尚未確立，所以，在授乳期間的婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時才可給藥。
- 對幼小兒的給藥：本劑對於幼小兒的安全性尚未確立，故請勿給藥。
- 其他：(1)本劑有止吐作用，所以可能會使因其他藥劑導致的中毒，腸阻塞，腦瘤等引起的嘔吐症狀變得不明顯。  
(2)對於正在給與本劑的患者，須注意勿使其從事開車等伴有危險性的機械操作。

【交互作用】 1.與抗膽鹼激性藥 (Atropine, Methyl Scopolamine等) 有藥理學性的拮抗作用，合併使用時有可能減弱抗膽鹼激性藥物之作用，故須避免與抗膽鹼激性藥併用。

2.本劑可能會使成為Digitalis 飽和時的指標如噁心、嘔吐、食慾不振症狀變得不明顯，所以在接受Digitalis劑給藥患者，須嚴密觀察，慎重給藥。

**【副作用】一、胃、十二指腸潰瘍時：**

1.內分泌系：偶有出現，推測是因間腦之內分泌機能調節異常（Gonadotropin分泌及Prolactin分泌異常）所導致的無月經，持續性地乳汁分泌及男女子乳症等，故須嚴密觀察，若認定有異常時，須立即中止給藥。

2.錐體外徑系：罕有震顫、舌攀縮、焦躁感等，但有這種情形時，仍須中止給藥。另外，長期給藥時，罕有口周部等不隨意運動在停藥後仍可能持續的情形發生。

3.消化系：偶有口渴、胃灼熱、噁心、嘔吐、便秘等。

4.其他：罕有發疹、浮腫，但有這種情形時，仍須中止給藥。另外，偶有熱感、倦怠感、失眠、嗜睡、眩暈、搖晃，另外，罕有性慾減退。

**二、精神分裂病時：**

1.心、血管系：急劇增量時，在心電圖可能有變化，故須慎重給藥。另外，偶有血壓降低，罕有血壓升高、胸悶、心搏過速等。

2.致類神經病症惡性症候群(Neuroleptic Malignant Syndrome)：出現運動不能，強度的肌肉僵硬、吞嚥困難、心搏過速、血壓的變動、發汗等，若接著有發熱時，須中止給藥，並採取冷卻身體、水分補給等的全身性處理。在本症發症時見有白血球增加及血清CPK上昇情形。另外，曾有過伴有Myoglobin尿之腎功能減低情形。

此外，曾有高燒持續，轉變成意識障礙、呼吸困難、循環虛脫、脫水症狀、急性腎衰竭而死亡的病例報告。

3.錐體外徑系：偶有帕金森氏(Parkinson)症候群（震顫、肌肉僵硬、流口水等，不自主運動(Dyskinesia)（舌攀縮、語言障礙、頸肌扭轉、眼球轉動、注視痙攣、吞嚥困難等），靜坐困難(Akathisia)，所以，當有這類症狀時，須採取減量或併用抗帕金森氏症候群製劑等適當的處置。另外，長期給藥時，罕有口周部等的不隨意運動在停藥後仍會持續的情形發生。

4.內分泌系：偶有出現，推測是因間腦之內分泌機能調節異常Gonadotropin分泌及Prolactin分泌異常所導致的乳汁分泌，男女子乳症、月經異常、射精不能等，故須嚴密觀察，慎重給藥。

5.精神神經系：偶有睡眠障礙、不穩、焦躁、嗜睡、興奮。另外，罕有健忘、發呆、徘徊、過動、缺乏抑制、無慾狀態、痙攣等。另外，偶有出現躁轉或躁狀態。

6.自律神經系：偶有無力、倦怠感、口渴、頭痛、頭重、眩暈、浮遊感、排尿困難、運動失調，另外，罕有熱感、發熱。

7.消化系：偶有噁心、嘔吐、便秘、食慾不振、胃部、腹部不適感，另外，罕有腹瀉胃灼熱、腹痛、食慾亢進等。

8.肝臟：偶GOT.GPT.A1-P等之上昇。

9.皮膚：偶有發疹，另外，罕有濕疹惡化、搔癢感等，在這種情形下，仍須中止給藥。

10.眼：罕有視力障礙，眼球冷感、重感、眼睛之幻視等。

11.其他：偶有浮腫，所以，在這種情形下，須中止給藥，另外，偶有體重增加，性慾減低等，另外，罕有頻尿、腰痛等。

**【警**

**語】**依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

**【保存條件】**本藥應貯存於室溫(15-30°C)緊密容器、避光貯存。

**【包裝】**6-1,000粒 P.T.P.鋁箔盒裝及塑膠瓶裝。



Code No. : K-46

**強生化學製藥廠股份有限公司**

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405