

舒胃錠

SUWELL TABLETS "EVEREST"

衛署藥製字 第 034886 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

由於日常生活的緊張或因暴飲暴食而致引起胃酸過多、脹氣的現象。本藥為制酸劑Aluminum Hydroxide, Magnesium Hydroxide配合消泡劑Simethicone，不但具有制酸力，也有消泡作用，使胃腸內氣體排出，對於緩解脹氣有功效，因此本藥為胃酸過多、及腸胃脹氣的緩解劑。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每錠內含：

Dried Aluminum Hydroxide Gel.....200mg

Magnesium Hydroxide.....200mg

Simethicone.....25mg

單次劑量（2錠）之酸中和能力為17.6mEq，鎂含量為13.72mEq，鈉含量為7.2mEq。

1.2 其他成分(賦形劑)

Corn Starch、Sucrose、Strawberry Essence、Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate、Sodium Saccharin、Erythrosine、Menthol。

2 用途(適應症)

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 消化道潰瘍的人。

3.2.3 有腎臟疾病的人。

3.2.4 須限鹽飲食的人。

3.2.5 腎衰竭的人（長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用）。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 與其他藥品併用時。

3.4 其他使用上注意事項

- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- 3.4.4 勿超過建議使用量。
- 3.4.5 制酸劑的錠劑應嚼碎後吞服。

4 用法用量

一天3次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。

年齡	使用量
成人及12歲以上	每次2錠
6歲以上未滿12歲	每次1錠
3歲以上未滿6歲	每次1/2錠
3歲以下嬰幼兒	請洽醫師診治，不宜自行使用。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

12~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝、2000錠塑膠瓶裝。

7 儲存方式

25°C以下、防濕、遮光保存。

製造廠

永勝藥品工業股份有限公司

嘉義縣民雄鄉興南村頭橋工業區工業三路6之3號

藥商

永勝藥品工業股份有限公司

嘉義縣民雄鄉興南村頭橋工業區工業三路6之3號