

● 止血 ●
“大豐” 50毫克/毫升
止血敏注射液
TRANEXAMIC ACID INJECTION 50mg/ml "T.F."

【成分】：每ml中含有：

Tranexamic Acid.....50mg

【賦形劑】：

Sodium Bisulfite, Water for Injection.

【適應症】：

全身及局部出血或出血性疾病。

【用法用量】：

通常成人一日1~2安瓿，分1~2次靜脈或肌肉注射，手術中或手術後視必要情形一次2~10安瓿，直接或混合鹽水液或葡萄糖液等點滴靜脈注射。本藥限由醫師使用。

【注意事項】：

1. 有下列症狀之患者應謹慎投與。
有血栓症的患者（腦血栓、血栓性靜脈炎等）及恐會引起血栓症的患者。

2. 副作用：

皮膚：常有騷癢、發疹等現象。

其他：時常會有想睡意（嗜眠）。

3. 投藥時的注意：

靜脈注射要緩慢，假如快速注射恐會引起噁心、心悸亢進，血壓降低等症狀。

【包裝】：

5毫升玻璃安瓿裝，100支以下盒裝。

衛署藥製字第033593號



PIC/S GMP藥廠

大豐製藥股份有限公司

公司·工廠：彰化縣彰化市延平里岸頭巷11號