

艾胃逆服咀嚼錠

Algita Chewable Tablets

衛署藥製字 第 031800 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

每錠含

有效成分及含量：

Alginic acid.....0.200g

Magnesium carbonate (light).....0.040g

Aluminum hydroxide gel (dried).....0.030g

(註：鎂含量為 0.8mEq)

1.2 其他成分(賦形劑)

Hydrated Silica、Sucrose、Lactose Spray Dried、Povidone K-30、Citric Acid
Monohydrate、Caramel Flavor、Sodium Bicarbonate、Vanillin、Strawberry Flavor、
Magnesium Stearate

2 用途(適應症)

逆流性食道炎、裂孔赫尼亞、胃灼熱、胃及十二指腸潰瘍、胃酸過多。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 三歲以下。

3.2.2 消化道潰瘍的人。

3.2.3 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟式症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用)。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射，宜保存於 25°C 以下。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 每一錠含鈉 0.4mEq。

3.4.5 本藥應於口中咀嚼或溶化後服用。

3.4.6 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

4 用法用量

一日服用次數	每次服用量
3 次	2 錠

餐後咀嚼服用，睡前服用效果更佳。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

部位	副作用
腸胃道	腹瀉、便秘、噁心、嘔吐、打嗝

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

4~1000 錠鋁箔盒裝。

7 儲存方式

避免陽光直射，請置於適當陰涼處所(25°C以下)。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

9 作用

藻膠酸(Alginic acid)與碳酸鎂(Magnesium carbonate, light)之混合物，具有產生持續保護性泡沫之功能。因此，當胃酸逆流時，可藉此保護敏感之胃壁與食道壁黏膜。

10 說明

本產品由於主原料及蔗糖因素產生黃褐色斑點，經檢驗不影響產品品質，請安心使用。

製造廠

臺灣東洋藥品工業股份有限公司六
堵廠 基隆市七堵區工建西路5號

藥商

臺灣東洋藥品工業股份有限公司 台北市南港區園區街3之1號3樓