

“生達” **血迅**<sup>®</sup> 膠囊250公絲  
(妥內散酸)

**Trand**<sup>®</sup> Capsules 250 mg  
"Standard" (Tranexamic Acid)

Plasmin是造成出血症狀(如紫斑病、再生不良性貧血、白血病)及滲透性皮膚疾患的重要原因，“生達”血迅注射液及膠囊可以阻斷Plasminogen activator與Plasmin之作用，所以可以抑制各種出血症狀，同時也可以強化血管，改善血管通透性而抑制過敏性皮膚之發生。

**主 成 分：**每一膠囊含：

Tranexamic acid ..... 250 mg

**特 點：**

- 1.強力的抗Plasmin、止血作用。
- 2.能改善過敏及炎症反應。
- 3.毒性低、副作用少，亦無致畸胎作用。
- 4.作用時間長，吸收快，效果優異，可於短時間內到達最高血中濃度。

**適 應 症：**

全身及局部出血或出血性疾病。

**用法用量：**

通常成人一日量3-8粒，分三到四次服用。

本藥須由醫師處方使用。

**注意事項：**

以下的病人請慎重投與：

- 1.已得血栓之病人（腦血栓、心肌梗塞、血栓靜脈炎）或者可能引起血栓之病人。
- 2.有凝血障礙之病人（要與Heparin併用才可以）。
- 3.對本劑已產生過敏之病人。
- 4.高齡者投與：一般高齡者生理機能低下，最好減量使用。

**副 作 用：**

- 1.過敏症：萬一發生過敏現象，請停止投藥。
- 2.皮膚：偶有搔癢感及發疹等症狀。
- 3.消化器官：（口服）食慾不振、噁心、嘔吐。
- 4.其他偶有輕微睡意之可能。

**相互作用：**

與其他止血性製劑大量併用可能有增加血栓形成之傾向，如須併用須慎重投與。

**賦 形 劑：**

Lactose Spray Dried、Magnesium Stearate、Gelatin、Titanium Dioxide、Purified Water、Sunset Yellow FCF、Sodium Lauryl Sulfate、Cochineal Red A、Tartrazine、Glycerin

**貯存條件：**25°C以下儲存。

**包 裝：**1000粒以下塑膠瓶裝、盒裝。

衛署藥製字第041226號



PIC/S GMP藥廠  
**生達化學製藥股份有限公司**  
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.  
台南市新營區土庫里土庫6之20號