

“優良” 優賜定注射液 2.5 公絲/公撮^{3LT0951}

(唯律脈必利)

U- SODIN INJECTION 2.5mg/ml (Verapamil)

“優良” 優賜定注射液 U-Sodin Injection 是一種鈣拮抗劑，主成分為 Verapamil HCl，靜脈注射用。

藥 理：

“優良” 優賜定注射液功能為抑制鈣離子之經由慢速離子流進入傳導與收縮之心肌細胞，及脈管平滑肌細胞，又因其作用於心臟傳導系統細胞而呈現抗心律不整作用。

成 份：

2 毫升安瓿裝，每毫升含：

Verapamil Hydrochloride.....2.5mg

作 用：

本品注射後能直接經由介入心肌細胞能量消耗的代謝過程和間接經由末稍阻力的減小來降低心肌氧的消耗(後負荷)，本品又能降低血管平滑肌的張力，並且預防冠狀動脈痙攣及降低血壓，又有顯著的抗心律不整作用，尤其是上心室心律不整，本品又能延長房室結(A-V node)衝動之傳導，因此恢復竇律動及正常之心室速率。

適 應 症：

陣發性上室性心搏過速、對於心房撲動、心房纖維顫動情況時，快速心室心搏之暫時性控制。

用 法：

靜脈注射及輸注使用

本藥限由醫師使用

劑 量：

成人一次1 Amp.，必要時一天可注2~3次，限緩慢靜脈注射。

副 作 用：

正如所有延遲房室傳導之抗心律不整藥一樣，Verapamil HCl能產生一度或二度之房室阻隔(A-V block);在嚴重的病例中，可能完全阻隔並伴隨著或不伴隨繼發性收縮不全。因 Verapamil HCl不影響心房或心室的傳導速率和反拗期，故它促進心室纖動的危險性非常小。

即使在正常張力的病人，經由末稍阻力的減少，靜脈注射Verapamil HCl可導致輕微及短暫之血壓下降。

若心臟不再增加心輸出量以維持正常血壓時，危急性的血壓下降將會產生。

偶而面部發生潮紅。

禁 忌 症：

心因性休克(除了心律不整引起之休克)，急性心肌梗塞引起之併發症(心跳過慢、低血壓、左心衰竭)。

二度和三度的房室阻斷(A-V block)。

竇性心跳不穩症候者。

嚴重心衰竭症候者。

當第一度房室阻斷，竇性心跳過慢及低血壓存在時，使用本品應特別注意。

心衰竭存在時，在給予本品之前，心配醣體全部代償必須完成。對於肝機能衰退的病人(肝實質喪失/減少血液供給)，本品的功效會增強且延長，此因藥物代謝功能不良所致。在這些病例中，劑量應被調整並特別小心照料。

藥物交互作用：

當本品和心臟抑制作用藥或房室傳導抑制作用藥同時使用時，應隨時注意藥物之相加作用。

若病人正服用β-腎上腺素激性阻斷劑時，儘量避免使用本品。

服抗高血壓劑之病人應特別注意本品對降低血壓具有加成性。

注意事項：

1. 使用本品若病人一時心跳停止時，應即實施體外心臟按摩，人工呼吸，用心電圖鑑別收縮不全和心室纖動之差異，然後進一步作適當治療如去纖維顫動或用節律

器治療。

2. 若發生二度或三度之房室阻斷時，可使用 Atropine，Orciprenaline，必要時可使用節律器。
3. 若有擴張性心肌能不全發生時，可使用 Dopamine，Dobutamine，Cardiac Glycosid 或鈣劑。
4. 若發生血壓下降時，可使用 Dopamine，Dobutamine，或 Norepinephrine。
5. 孕婦初期三個月，應特別小心使用。
6. 使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。

儲存：

本藥品需避光貯存，以穩定藥效。

賦形劑：

Sodium Chloride

Hydrochloric Acid

Water for injection

包裝：

“優良” 優賜定注射液係 2 毫升安瓿裝。

100 支以下安瓿盒裝

衛署藥製字第 027307 號



委託者：優良化學製藥股份有限公司

地址：臺北市內湖區內湖路一段 392 號 11 樓之 1

製造廠：瑞士藥廠股份有限公司新市廠

地址：臺南市新市區中山路 182 號