



降血壓劑

UST50-004
衛署藥製字第044843號

優心[®]

(阿廷諾)

膜衣錠 50毫克

Urosin[®]

(Atenolol)

Film Coated Tablets 50mg

3.98cm

【成分名】 Atenolol

【劑型、含量】 膜衣錠：每錠含Atenolol.....50mg

【賦形劑】

Microcrystalline Cellulose、Calcium Carboxymethyl Cellulose、Talc、Magnesium Stearate、Colloidal Silicon Dioxide、Hydroxypropyl Methylcellulose、Polyethylene Glycol 6000。

【臨床藥理】

Atenolol是一種乙型腎接受體阻斷劑(β_1 -Adrenergic Receptor Blocker Agent)，具有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，可降低心率及收縮力，對減除心絞痛病人之症狀有效，對高血壓的治療亦有效。口服單一劑量其藥效可達二十四小時之久；由於劑量範圍狹窄且作用迅速，很快便可看出藥物在病人身上效果，且服藥方法簡單，易被病人接受。

【適應症】

高血壓、狹心症。

【用法、用量】

本藥須由醫師處方使用。

1. 成人：

(A) 高血壓：起始劑量50mg可單獨每日服用1次，或與利尿劑及其它抗高血壓治療劑同時使用，若效果不明顯則提高到一天100mg，一般服用1-2星期就會有完全之療效。

(B) 狹心症：起始劑量50mg每日1次，若一星期內效果不明顯則提高劑量到一天100mg，有些病人須提高到200mg才能達到適當效果。

2. 兒童：本藥物尚無用於兒童之經驗，故不宜使用。

3. 老人：劑量也許要減低，特別是腎功能不全的病人。

【注意事項】

【禁忌】

1. 患有二度或三度心臟傳導阻斷的病人不可服用本劑。

2. 不可與Verapamil同時服用，若須服用Verapamil，則須事先停止使用本劑。

【注意事項】

1. 未經治療的心臟衰竭患者，禁服本藥，若經過治療的心臟衰竭患者，可推介本藥物，但服用後若有鬱血性心臟衰竭的情況發生時，則應暫停使用。

2. 本藥物藥理作用之一是降低心跳率，可能出現心跳緩慢現象，若發生此時可減少藥量。

3. 本藥物是有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，所以患有慢性呼吸道阻礙的病人需小心使用。因它也可能引起氣喘病人的呼吸道阻礙。

4. 患有心缺血病人，治療不可突然中斷，如果本藥物與Clonidine同時服用時，Clonidine不宜中斷服用，須直至本藥物停止服用後數天才可停止。

5. 用於麻醉手術前，宜停用本藥物且間隔須四十八小時以上，如治療要繼續使用，麻醉劑如乙醚，Cyclopropane及Trichloroethylene宜特別注意，若發生Vagal dominance，可以用1-2 mg(l. V.) Atropine解除。

6. 本藥物是經由腎臟排泄，所以對嚴重腎臟機能失常的病人應依情況調整劑量。

一般而言病人其Creatinine Clearance若為15-35mL/min/1.73m²則服用劑量應為每日50mg；若小於為15mL/min/1.73m²則服用劑量應每隔一天服用50mg。

7. 孕婦：像其它藥物，除非必要，否則最好不要服用。

FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：D

【過量處理】

過度心跳緩慢可用Atropine 1-2mg靜脈緩慢注射，若需要時，可加上乙型接受器興奮劑，如Isoprenaline 25 μ g或Orciprenaline 0.5mg靜脈緩慢注射但必須防止血壓下降太低。

【副作用】

一般的副作用是由於本身藥理作用所引起的。但極少發生。

包括四肢冰冷、肌肉疲勞和心跳緩慢，至於其他乙型接受體阻斷劑常見的睡眠不寧，本藥物無此報告，很少有皮膚疹及乾眼之報告，若副作用無法加以解除則需考慮停止用藥，而停止使用是要漸進為之。

【保存條件】

於25 $^{\circ}$ C以下、避光儲存。

【包裝】

2~1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2151367