

---

Vitamin C 注射液

**美 達 康** 注射液

**Vitacicol Injection**

---

**【組 成】**

Vitacicol 為維他命丙 (Vitamin C) 之滅菌水溶液。其 1ml 中含有：

Vitamin C ..... 50mg

賦形劑：Benzyl Alcohol、Sodium Bicarbonate、  
Sodium Bisulfite、Water for Injection。

**【適 應 症】**

維他命 C 缺乏症。

**【用 法 用 量】**

Vitacicol 通常每日用 1ml~2ml 行皮下或肌肉內或靜脈內注射，對於重症例時，可應其必要一日中注射數次。本藥限由醫師使用。

**【注 意 事 項】**

本劑會影響各種尿糖檢查值，可能造成假陰性反應。

**【保 存 條 件】**

請儲存於 25°C 以下，避免陽光直射之處所。

本品應於紙盒內保存，使用前才可取出，以避免光線照射（內附黑色避光袋）。

存取本品應避免碰撞造成玻璃瓶發生裂隙，導致藥液變色，若發現此現象則停止使用該瓶藥液。

**【包 裝】**

玻璃安瓿：2ml

內衛藥製字第 006513 號



**信東生技股份有限公司**  
桃園市桃園區介壽路 22 號

54220090 ㊟