

營 養 劑

“信東”

美 達 研注射液5%
Vitagen INJECTION 5%

【組 成】

主成分：Each ml contains：

Glucose · H₂O..... 50mg

賦形劑：Water for Injection。

【適 應 症】

病中病後、嘔吐、胃腸障礙、失去知覺時之營養補給。

【用 法】

- 1.皮 下 注 射：將等張液注於大腿部皮下為佳。
- 2.靜脈內注射：尤其是滲透療法及使用大量的糖分時以本法為便利。
本藥限由醫師使用。

【注 意】

- 1.靜脈內注射時，因體質之不同，注射之後，有時可能誘發輕度的惡寒戰慄或發燒，這時使用強心劑，或令安靜即可。
- 2.對於糖尿病重症患者，宜避免使用本劑為佳。

【使用之注意事項】

(一)取用時：

- 1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
- 2.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(二)輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
- 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(coring)產生碎片。
- 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。
- 4.因加藥有必要重覆插入橡皮塞時，避免反覆穿刺相同位置。

【保存條件】

25℃以下儲存。

【包 裝】

玻璃安瓿：20毫升

玻 璃 瓶：100毫升，250毫升，500毫升，1000毫升

塑膠安瓿：20毫升

塑 膠 瓶：500毫升，1000毫升

塑膠軟袋裝：20毫升，100毫升，250毫升，300毫升，500毫升，1000毫升

100支以下盒裝

內衛藥製字第006066號



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號

54220320®

